

甘草



甘草为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fischer、胀果甘草 *G. inflata* Bat.、或光果甘草 *G. glabra* L. 的干燥根和根茎。

药材名 Cha-Em-Chin, Cha-Em-Thet (泰文名)、Gancao (汉语拼音名)、Liquorice Root、*Glycyrrhizae Radix et Rhizoma*。

药材性状

根呈圆柱形，外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹。气微，味甜而特殊。



主要产地


主产于内蒙古、甘肃、新疆及东北西部地区。



炮制方法

1. **甘草片**：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

2. **炙甘草**：取炼蜜，加适量开水稀释后，淋入净甘草片中拌匀，闷润，置炒制容器内，用文火加热，炒至老黄色，不粘手时，取出晾凉。每 100kg 甘草片，用炼蜜 25kg。



中药功能

味甘，平。归心、肺、脾、胃经。

1. **甘草片**：本品味甘偏凉，长于泻火解毒，化痰止咳。多用于痰热咳嗽，咽喉肿痛，痈疽疮毒，食物中毒及药物中毒。

2. **炙甘草**：本品甘温，以补脾和胃，益气复脉力胜。常用于脾胃虚弱，心气不足，脘腹疼痛，筋脉挛急，脉结代。

泰药功能

味甘。用于心气不足，化痰解毒（止咳），润喉，调和药味。

用法用量 煎服，1.5-9 g。

注意 不宜与京大戟，红大戟，芫花，甘遂，海藻同用。高血压、肝硬化、慢性肾功能不全患者，孕妇禁用。



这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，
仅对外宣传和传播科普知识所用。
禁止擅自用于任何形式的商业谋利。